


みなさん、暑い季節になりましたが、夏バテしていないですか？
適度な水分摂取を心がけましょう！

今回はシャントエコーとPTAについて、以前と変更になった点や追加された項目について説明したいと思います。

シャントエコー

シャントエコーを行ったあと、毎週月、火曜日に血管外科の先生が回診しています。回診を行ったあと、血管外科の先生の指示のもと、PTAを行うのか、次のシャントエコーはいつ行うのか、を決めています。


PTA

PTAとは詰まったリ細くなったリした血管を広げる手術です。

PTA後の流れについてです。

PTAが終わった後、10分間手抑え止血を行います。


止血を確認したあとに15分間様子を見る時間を設けました(その間に着替えなどをしてもらい、動いても出血や腫れなどの問題が無いかを見ます)。15分後、スタッフが腫れやシャント音の確認をし、問題が無ければ帰宅して大丈夫です。



止血後は全員「インジェクションパッド」を貼ります。インジェクションパッドを貼ってかゆみが出る場合は教えてください。また、血が出やすい患者さんはインジェクションパッドの上から「テガードーム」という透明のフィルムを貼り保護します。テガードームを貼った方は次の透析日までにはがさないようにしてください。次回の透析の麻酔テープをどこに貼れば良いかわからない場合はスタッフに相談してください。



↑ インジェクションパッドという
ばんそうこうのような物です



↑ 赤線で囲った部分が透明のテガードームです。
⚠ このようにテガードームが貼ってある方は
次の透析日までにはがさないでください。

PTAは 9時、10時、13時、14時からの方は今までと同様に 30分前に来院してください。PTAは 11時から、午後15時以降からの方は 45分前に来院してください。

PTA当日は食事をとらないで来ていただくため、リンや血糖の薬などは
飲まないようにしてください。その他の血圧の薬などはいつも通り飲んで
きてください。わからない場合はスタッフに聞いてください。

